

# Kalendář povinných očkování

Jedna vakcína chrání proti vícero chorobám, některé vakcíny je potřebné aplikovat ve více dávkách.

## věk dítěte



## nemoc



## vakcína



4. den - 6. týden

tuberkulóza (u rizikových dětí s indikací)

BCG vaccine SSI

od 9. týdne | první dávka  
4. měsíc | druhá dávka  
11. - 13. měsíc | třetí dávka

záškrť, tetanus,  
černý kašel, dětská obrna,  
hepatitida typu B ad.

Hexavakcína:  
Infanrix hexa  
3 dávky (schéma 2+1)

13. - 18. měsíc | první dávka  
5. - 6. rok | druhá dávka

spalničky  
zarděnky, příušnice

M - M- RVAXPRO  
2 dávky

5. - 6. rok

záškrť, tetanus, černý kašel

dTap vakcína: Boostrix

10. - 11. rok

záškrť, tetanus, černý kašel, dětská obrna

dTap - IPV vakcína: Adacel polio



Medici PRO Očkování

# Kalendář doporučených očkování

Jedna vakcína chrání proti vícero chorobám, některé vakcíny je potřebné aplikovat ve více dávkách.

## věk dítěte



## nemoc



## vakcína



od 6. týdne | 1. dávka  
4 týdny poté | 2. dávka

rotavirová  
enteritida

Rotarix | 2 dávky  
nehrazené pojišťovnou

2. – 3. měsíc | první dávka  
4. – 6. měsíc | druhá dávka  
12. – 15. měsíc | třetí dávka

invazivní meningokokové onemocnění  
typu B (IMO), invazivní pneumokokové  
onemocnění (IPO)

Bexsero | 3 dávky  
Prevenar 13, Synflorix  
3 dávky

12. – 15. měsíc

invazivní meningokokové onemocnění A, C, W, Y

Nimenrix | 1 dávka

13. – 14. rok

onemocnění lidským papillomavirem HPV

Gardasil 9 | 2 dávky

14. – 15. rok

invazivní meningokokové onemocnění (IMO B)  
invazivní meningokokové onemocnění (IMO A, C, W, Y)

Trumenba  
Nimenrix

